

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

1. ¿Qué contiene CLORHYP FQ y para qué se utiliza?

Clorhup FQ es una solución concentrada de cloruro de sodio para nebulizar. Se utiliza para hacer más fluidos el moco y la flema bronquial en pacientes con moco espeso en las vías respiratorias.

Propiedades:

En los pacientes con moco espeso (bronquiolitis aguda, fibrosis quística), las secreciones bronquiales se vuelven altamente viscosas, por deficiencia del transporte de agua y sales a través de la membrana superficial de los bronquios. Este moco viscoso no se puede remover naturalmente y favorece la aparición de procesos inflamatorios y/o infecciosos. Las soluciones salinas hipertónicas nebulizadas, mediante un proceso osmótico, favorecen el pasaje de agua a través de la membrana bronquial, hidratando el moco y haciéndolo más fluido para que se pueda luego eliminar mediante tos productiva, expectoración y/o fisioterapia. Los tratamientos a corto plazo con soluciones salinas hipertónicas redundan en un mejoramiento de la fluidez y el transporte del esputo, de la hidratación de la superficie de las vías aéreas y de la eliminación de las mucosidades y la función pulmonar de estos pacientes.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a utilizar CLORHYP FQ?

Este producto es para administrar exclusivamente por vía inhalatoria (nebulización).

No debe ingerirse ni inyectarse.

Administrar a temperatura ambiente (no usar si el producto se encuentra frío, y tampoco debe ser entibiado por encima de la temperatura de conservación), y descartar los remanentes. Siempre se debe limpiar y desinfectar el nebulizador tras cada aplicación.

No se debe emplear si siente una notoria dificultad para respirar (crisis asmática o broncospasmos).

No se ha determinado su seguridad y eficacia en menores de seis años.

Algunos pacientes pueden experimentar con el producto excesiva irritación de la membrana bronquial, por este motivo se recomienda que la primera administración se haga en presencia de un médico especialista que pueda evaluar su tolerancia a este medicamento.

Si usted nota algún efecto adverso durante la administración del producto, debe suspender el tratamiento y consultar a su médico.

Su médico puede indicarle la administración previa de un medicamento broncodilatador, que permitirá una mejor aplicación de este producto. Siga cuidadosamente las instrucciones del médico respecto de cuánto tiempo antes debe administrarlo, y que dosis debe utilizar. El broncodilatador puede mejorar o evitar la posible sensación de falta de aire, y mejorará el efecto de este medicamento. Para notar una mejoría de su afección, puede ser necesario que use este medicamento durante varios días.

Debe emplearse el producto con precaución en menores de 14 años; pacientes asmáticos; pacientes con enfermedades cardíacas; hipertensión; enfermedad hepática o renal; epilepsia; cefalea, migraña; intervención quirúrgica reciente; dietas reducidas en sodio.

No debe mezclar este producto con otras preparaciones en el nebulizador, salvo que se lo indique el médico.

Embarazo y lactancia: Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No tome este medicamento si: ha presentado hipersensibilidad a las soluciones salinas hipertónicas de cloruro de sodio para nebulizar.

3. ¿Qué le debería decir a su médico antes de utilizar CLORHYP FQ?

Antes de utilizar este producto Ud. debe informar al médico si padece de broncoconstricción, asma, problemas de hipertensión (presión alta), dietas reducidas en sal, o problemas cardíacos. Informe a su médico si usted toma otros medicamentos, inclusive si los mismos son de venta sin receta.

Posibles interacciones con otros medicamentos:

Este medicamento puede afectar la acción de otros remedios. Esta posibilidad debe ser evaluada por su médico cuidadosamente. Debe ser usado con precaución en los pacientes que están bajo tratamiento con: suplementos de potasio; diuréticos (medicamentos para aumentar la cantidad de orina y bajar la presión sanguínea); corticosteroides; hipo o hipertensores (medicamentos para controlar la presión sanguínea); drogas que aportan sodio.

4. ¿Cómo utilizar CLORHYP FQ?

Preste especial atención en que concentración le ha sido indicado el producto. En base a su afección o a su tolerancia, el médico le ha indicado **Clorhup FQ 3,5%** o **Clorhup FQ 7%**.

Ambas presentaciones del producto se utilizan de la misma forma.

Este medicamento es una solución para administrar por medio de un nebulizador.

No debe ser inyectado ni ingerido.

Una monodosis de solución hipertónica suministrada por nebulización, tardará aproximadamente 10 a 20 minutos en ser administrada.

Niños y Adultos:

La solución salina para nebulizar puede ser administrada a pacientes de 6 años de edad en adelante bajo control médico.

Se recomienda nebulizar el contenido total de una ampolla en cada aplicación, con una frecuencia de 2 o 3 nebulizaciones diarias. La dosis máxima recomendada es de 4 ampollas diarias.

Los broncodilatadores también ayudan a mejorar la deposición de la solución salina hipertónica en el pulmón. El uso de un broncodilatador como salbutamol es a veces administrado previamente a la administración de la solución salina hipertónica, para evitar cualquier falta de aire asociada con la utilización de la misma. Siga estrictamente las instrucciones de su médico.

Modo de administración:

- Retire una monodosis del estuche.
- Abra la monodosis para ser usada inmediatamente y vacíe su contenido completamente dentro del reservorio del nebulizador.
- Efectúe las conexiones necesarias en el nebulizador y ubique la máscara para suministrar por vía aérea superior.
- Sentado en posición vertical, accione el compresor. Respire profunda y calmadamente, y lo más parejo posible hasta que no se produzca más niebla en el nebulizador.
- Higienice el nebulizador.

5. ¿Qué efectos adversos puede producir CLORHYP FQ?

Los efectos adversos más comunes son: tos, irritación faríngea (picazón o ardor de garganta), faringitis (dolor, dificultad para tragar), inflamación de la garganta, sensación de opresión torácica (presión sobre el pecho) y broncoespasmo agudo (dificultad para respirar, sensación de obstrucción de la garganta), que disminuyen o desaparecen con el uso reiterado del medicamento. Los episodios de tos mostraron una tendencia a disminuir en el plazo de las primeras dosis durante las primeras semanas de tratamiento.

La inhalación de solución salina concentrada le puede causar un gusto displacentero en la boca por lo que puede ser de ayuda enjuagar la boca con agua.

En cuanto aparezca cualquier síntoma inesperado, o ante señales de una reacción adversa severa (por ejemplo: edemas en extremidades, dificultad para respirar o tragar, contracturas musculares), interrumpa el tratamiento y consulte al médico.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en esta información informe a su médico o farmacéutico.

6. ¿Cómo conservar CLORHYP FQ?

Conservar en lugar seco, en su envase original, a una temperatura entre 15° y 30°C

¿Si usé más CLORHYP FQ del indicado por el médico?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas:(011) 4654-6648 // 4658-7777 // 0800-333-0160.
- Hospital Fernández: (011) 4808-2655 // 4801-7767

¿Tiene Usted alguna pregunta?

Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de **CLORHYP FQ**.

También puede contactarse con Laboratorios Valmax S.A. al Tel/Fax: (5411) 4621-1960 / 6910 o vía email a: **info@valmax.com.ar**

Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por:  **Valmax**

Director Técnico: Esteban P. Fuentes – Farmacéutico.

Suboficial Perdomo 1619, Ituzaingó (1714), Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Tel/Fax: (5411) 4621-1960 – info@valmax.com.ar – www.valmax.com.ar